



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ КАПСИКАМ®

Торговое название препарата: Капсикам®

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав:

1 г мази содержит:

активные вещества: диметилсульфоксида 50 мг, камфоры рацемической 30 мг, скипидара живичного 30 мг, бензилникотината 20 мг, нонивамида 2 мг;

вспомогательные вещества: цетостеариловый спирт эмульгирующий (тип А), натрия цетилстеарилсульфат, полисорбат-80, бронопол, вода очищенная.

Описание: мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета со специфическим запахом камфоры и скипидара.

Фармакотерапевтическая группа: местнораздражающее средство.

Код АТХ: M02AX92

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Мазь Капсикам содержит вещества, расширяющие сосуды и раздражающие рецепторы окончаний чувствительных нервов, таким образом, вызывая местнораздражающее, разогревающее и болеутоляющее действие. Местнораздражающий эффект изменяет и выборочно улучшает кровоснабжение и трофику тех внутренних органов, которые иннервируются соответствующими нервами сегментов спинного мозга. Дополнительное раздражение соответствующего сегмента спинного мозга вызывает дополнительную активацию антиноцицептивной системы, таким образом замедляя проведение болевого импульса к коре головного мозга, уменьшая боли.

Фармакокинетика

Быстро всасывается в кожу, вызывая ощущение тепла и покраснение кожи, в результате чего мышечное напряжение и боль уменьшаются. Температура кожи повышается на 1-2 °C, эффект длится 2-3 часа. Обезболивающее действие начинается в течение 30-40 минут и длится до 3-6 часов.

Повышение температуры кожи и улучшение кровообращения являются благоприятными факторами в случае ревматических состояний, ушибов, растяжения мышц и других спортивных травм.

При повторном применении действие сохраняется 10-14 дней.

Показания к применению

Мышечные и суставные боли.

Способ применения и дозы

Как согревающее средство для спортсменов: на кожу в области мышц наносят с помощью аппликатора 2-3 г мази и массирующими движениями втирают в кожу до покраснения. После тренировки мазь следует смыть с кожи прохладной водой.

Для облегчения боли на болезненный участок кожи наносят с помощью аппликатора и втирают 1-3 г мази 2-3 раза в день в зависимости от интенсивности боли, и накладывают повязку, таким образом, усиливая тепловой эффект. В среднем на лечебный курс расходуют 50-100 г мази.

После каждого применения мази следует вымыть руки прохладной водой с мылом.
Детям: отсутствует опыт применения.

Побочные действия

Побочные эффекты классифицированы соответственно группам систем и органов, а также частоте встречаемости MedDRA: очень часто ($>1/10$), часто ($>1/100$ до $<1/10$), реже ($>1/1000$ до $<1/100$), редко ($\geq 1/10\,000$, $<1/1000$), очень редко ($<1/10\,000$), частота неизвестна (нельзя определить по имеющимся данным).

Со стороны иммунной системы

Частота неизвестна: реакции повышенной чувствительности.

Со стороны нервной системы

Частота неизвестна: чувство жжения на коже.

Со стороны кожи и подкожных тканей

Редко: зуд.

Неизвестно: крапивница, отёк, покраснение.

При повышенной чувствительности кожи пациента к компонентам мази может появиться зуд, отек или крапивница. Упомянутые симптомы исчезают в течение 8-12 часов после прекращения применения мази.

Во избежание побочных действий желательно предварительно нанести на кожу небольшое количество мази, чтобы проверить чувствительность кожи к препарату.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность кожи к какому-либо компоненту мази,
- язвы или кожные заболевания.

Лекарственные взаимодействия

Исследования по взаимодействию не проводились.

Особые указания

Мазь нельзя наносить на повреждённую кожу. Во избежание сильного раздражения нельзя допускать попадания мази в глаза или на слизистые оболочки.

Не рекомендуется принимать горячие ванны до и после использования мази, т. к. это способствует открытию пор кожи и появлению чувства жжения.

Вспомогательные вещества цетостеариловый спирт эмульгирующий (тип А) и бронопол могут вызывать местные кожные реакции (в том числе, контактный дерматит).

Не рекомендуется использование детям и подросткам, т. к. нет достаточных данных о безопасности и эффективности его применения в этих возрастных группах.

Применение во время беременности и кормления грудью

Мазь не применяют в период беременности и кормления грудью, так как нет соответствующих данных о безопасности применения в это время.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и обслуживать движущиеся механизмы

Капсикам не влияет на способность управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы.

Передозировка

Симптомы при наружном применении: при нанесении на кожу слишком большого количества мази могут возникнуть покраснение кожи, легкий проходящий зуд или ощущение жжения.

Лечение: рекомендуется смыть мазь с кожи прохладной водой.

Симптомы при случайном проглатывании: тошнота, рвота и диарея; в тяжелых случаях – боли в животе, головная боль, головокружение, ощущение тепла/жара, судороги, угнетение дыхания и кома.

Лечение: симптоматическое, следует обратиться к врачу (упаковку препарата взять с собой). При тяжелых отравлениях нельзя вызывать рвоту.

Форма выпуска

мазь для наружного применения, по 30 г или 50 г в тубе алюминиевой вместе с инструкцией по применению и аппликатором помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25° С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

АО «Гриндекс».

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

Телефон: +371 67083 205

Факс: +371 67083 505

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

Представительство АО «Гриндекс» в Республике Узбекистан

г. Ташкент, ул. С Азимова, 51А

Тел.: 236-17-36