

«MA'QULLANGAN»

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi
Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining «Dori
vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va
standartlashtirish davlat markazi» DUK
«17» 05 2019 y. № 9

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА КАПСИКАМ®

Препаратнинг савдо номи: Капсикам®

Дори шакли: сиртга қўллаш учун суртма

Таркиби:

1 г суртма қўйидагиларни сақлайди:

фаол моддалар: 50 мг диметилсульфоксид, 30 мг рацемик камфора, 30 мг ҳаётбахш скипидар, 20 мг бензилникотинат, 2 мг нонивамид;

ёрдамчи моддалар: эмульгирловчи цетостеарил спирти (А тур), натрий цетилстеарилсульфати, полисорбат-80, бронопол, тозаланган сув.

Таърифи: ўзига хос камфора ва скипидар ҳидли, оқ ёки оч сарғиш тусли оқ рангли суртма.

Фармакотерапевтик гуруҳи: маҳаллий қитиқловчи восита.

АТХ коди: M02AX92

Фармакологик хусусиятлари

Фармакодинамикаси

Капсикам суртмаси қон томирларни кенгайтирувчи ва сезувчан нервлар охиридаги рецепторларни қитиқловчи моддалар сақлайди, шу йўл билан, маҳаллий қитиқловчи, қиздирувчи ва оғриқ қолдирувчи таъсир кўрсатади. Маҳаллий қитиқловчи самара орқа мия сегментларидаги мувофиқ нервлар орқали иннервация қилувчи ички аъзоларнинг қон билан таъминланиши ҳамда трофикасини ўзгартиради ва танлаб таъсир кўрсатган ҳолда, яхшилайди. Орқа миянинг тегишли сегментини қўшимча қитиқланиши антиноцицептив тизимнинг қўшимча фаоллашишини чақиради, шу йўл билан оғриқ импульсининг бош мия пўстлоғига ўтишини секинлаштириб, оғриқни камайтиради.

Фармакокинетикаси

Терига тез сўрилади, иссиқлик ҳиссини ва терининг қизаришини чақиради, бунинг натижасида мушаклар зўриқиши ва оғриқ камаяди. Тери ҳарорати 1-2С га ортади, самараси 2-3 соат давом этади. Оғриқ қолдирувчи таъсири 30-40 дақиқадан сўнг бошланади ва 3-6 соатгача давом этади.

Тери ҳароратининг ошиши ва қон айланишининг яхшиланиши ревматик ҳолатлар, лат ейишлар, мушаклар чўзилиши ва бошқа спорт травмалари мавжуд ҳолатларда ижобий омил ҳисобланади.

Такроран қўлланилганда, таъсири 10-14 кун сақланиб қолади.

Қўлланилиши

Мушак ва бўғим оғриқларида қўлланилади.

Қўллаш усули ва дозалари

Спортчилар учун қиздирувчи восита сифатида: тери устига мушаклар соҳасига аппликатор ёрдамида 2-3 г суртма суртилади ва тери қизаргунига қадар уқаланади. Машқлардан сўнг суртма совуқ сув билан ювиб ташланади.

Оғрикни энгилаштириш учун терининг оғрикли қисмига аппликатор ёрдамида суртилади ва оғрикнинг жадаллигидан келиб чиққан ҳолда 1-3 г суртма кунига 2-3 марта қўлланилади, шу йўл билан иссиқлик самараси кучайтирилади. Ўрта ҳисобда, даволаш курси учун 50-100 г суртма сарф этилади.

Суртма ҳар бир қўлланилгандан сўнг қўлларни совуқ сув ва совун билан ювиш керак.

Болалар: қўллаш тажрибаси йўқ.

Ножўя таъсирлари

Ножўя таъсирлар тизимлар ва аъзолар гуруҳига мувофиқ равишда, шунингдек MedDRA га асосан, пайдо бўлиш тез-тезликка кўра таснифланган: жуда тез-тез ($>1/10$), тез-тез ($>1/100$ дан $<1/10$ гача), тез-тез эмас ($>1/1000$ дан $<1/100$ гача), кам ҳолларда ($\geq 1/10\,000$, $<1/1000$), жуда кам ҳолларда ($<1/10\,000$), тез-тезлиги номаълум (мавжуд маълумотлар асосида аниқлашнинг иложи йўқ).

Иммун тизими томонидан

Тез-тезлиги номаълум: юқори сезувчанлик реакциялари

Нерв тизими томонидан

Тез-тезлиги номаълум: терида ачиштириш ҳисси.

Тери ва тери ости тўқималари томонидан

Кам ҳолларда: қичишиш.

Тез-тезлиги номаълум: эшакеми, шиш, тери қизариши.

Пациент терисининг суртма компонентларига нисбатан юқори сезувчанлигида қичишиш, шиш ёки эшакеми пайдо бўлиши мумкин. Келтирилган симптомлар суртмани қўллаш тўхтатилгандан 8-12 соатдан сўнг йўқолади.

Ножўя таъсирларнинг олдини олиш учун терининг препаратга нисбатан сезувчанлигини текшириш мақсадида кичик миқдордаги суртмани терига суртиб кўриш мақсадга мувофиқ.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

- Терининг суртма компонентларидан исталган бирига юқори сезувчанлиги бўлганда;
- яралар ёки тери касалликлари мавжуд бўлганда қўллаш мумкин эмас.

Дорилар билан ўзаро таъсири

Ўзаро таъсирлашиши бўйича тадқиқотлар ўтказилмаган.

Махсус кўрсатмалар

Суртмани шикастланган терига суртиш мумкин эмас. Кучли таъсирланишнинг олдини олиш учун суртмани кўз ёки шиллиқ қаватларга тушишига йўл қўймаслик керак.

Суртмани қўллашдан аввал ва ундан кейин иссиқ ҳаммом қабул қилиш тавсия этилмайди, чунки бу тери тешикларининг очилишига ва ачиштириш ҳиссининг пайдо бўлишига олиб келиши мумкин.

Ёрдамчи моддалар эмульгирловчи цетостеарил спирти (А тур) ва бронопол маҳаллий тери реакцияларини чақириши мумкин (жумладан, контакт дерматит).

Болалар ва ўсмирларда қўллаш тавсия этилмайди, чунки ушбу ёш гуруҳларида қўллаш хавфсизлиги ва самарадорлиги бўйича етарли маълумотлар йўқ.

Ҳомиладорлик ва эмизиш даврида қўлланиши

Суртма ҳомиладорлик ва эмизиш давларида қўлланилмайди, чунки ушбу вақтда қўллаш хавфсизлиги бўйича тегишли маълумотлар йўқ.

Транспорт воситаларини бошқариш ва ҳаракатланувчи механизмларга хизмат кўрсатиш қобилиятига таъсири

Капсикам транспорт воситаларини бошқариш ва механизмларга хизматга кўрсатиш қобилиятига таъсир қилмайди.

Дозанинг ошириб юборилиши

Ташқи қўлланилгандаги симптомлари: жуда катта миқдордаги суртма териға суртилганда тери қизариши, енгил ўтиб кетувчи қичишиш ёки ачиштириш ҳисси пайдо бўлиши мумкин.

Даволаш: суртмани теридан совуқ сув билан ювиш ташлаш тавсия этилади.

Беихтиёр ютиб юборилгандаги симптомлари: кўнгил айнаши, қусиш ва диарея; оғир ҳолларда – қорин оғриғи, бош оғриғи, бош айланиши, илиқлик/иссиқлик ҳисси, тиришишлар, нафас олишнинг сусайиши ва кома.

Даволаш: симптоматик, шифокорга мурожаат қилиш зарур (препарат ўрамини ўзингиз билан олволинг). Оғир захарланиш ҳолатларида қусишни чақиритиш мумкин эмас.

Чиқарилиши:

30 г ёки 50 г дан алюминийли тубада тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси ва аппликатори билан бирга ташқи қўллаш учун суртма картон қутига жойланади.

Сақлаш шароити

25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин. Музлатилмасин.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилиқ муддати

2 йил.

Ўрамида кўрсатилган яроқлилиқ муддати ўтгач, қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

АО «Гриндекс».

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

Телефон: +371 67083 205

Факс: +371 67083 505

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

Представительство АО «Гриндекс» в Республике Узбекистан

г. Ташкент, ул. С Азимова, 51А

Тел.: 236-17-36